

GUÍA DE LAS RAPACES MIGRATORIAS VISTAS EN SURAMÉRICA

Estas son las rapaces migratorias observadas en diferentes zonas de Sudamérica. Muchas especies tienen una gran variedad de apariencias, dependiendo de la edad, el sexo y sus coloraciones.

BUTEOS

Alas anchas. Colas anchas y redondas, a menudo vistas volando en círculos.



Buteo platypterus

Aguililla de alas anchas

Alas redondeadas con margen alar marcado en adultos, cola ancha en forma de abanico con bandas negras y blanca



Buteo swainsoni

Aguililla de Swainson

Alas anchas y alargadas, ligeramente en puntas, plumaje de vuelo oscuro



**Buteo jamaicensis*

Aguililla cola roja

Cola clara sin marcas hasta roja: 9 fases. Patagiales muy visibles

MILANOS

Cola larga, delgada o triangular. Alas largas y agudas, en algunos casos anchas y redondeadas.



Ictinia mississippiensis

Milano de Mississippi

Alas largas y estrechas, cola triangular. Comportamiento acrobático y errático al volar.



* *Ictinia plumbea*

Milano plomizo

Similar a Mississippi, cola ligeramente más corta con una banda blanca. Parches anaranjados en las primarias de vuelo.



* *Elanoides forficatus*

Milano tijereta

Alas muy largas, delgadas y afiladas, cola en forma de tijera muy característico de la especie



* *Chondrohierax uncinatus*

Milano pico de gancho

Alas muy anchas y con "dedos" definidos, cola ancha y larga, aleteos lentos

Género Accipiter

Alas cortas y muy anchas. Cola larga



* *Accipiter cooperii*

Gavilán de Cooper

Forma de cruz: cola redonda y larga, alas cortas y cabeza prominente. Aleteos rápidos y pausados.



* *Accipiter striatus*

Gavilán pecho rufo

Forma de T: hombros pronunciados, cabeza pequeña. Cola recta y cuadrada

* Observado al norte del continente
☒ Con poblaciones residentes

GUÍA DE LAS RAPACES MIGRATORIAS VISTAS EN SURAMÉRICA

Estas son las rapaces migratorias observadas en diferentes zonas de Sudamérica. Muchas especies tienen una gran variedad de apariencias, dependiendo de la edad, el sexo y sus fases.

HALCONES

Alas largas y puntiagudas, cola larga y delgada. Cuando no está en vuelo directo, silueta menos puntiaguda. Vuelo activo y directo con rápidos aleteos.



☒ *Falco peregrinus*

Halcón peregrino

Cola larga redondeada, aleteos rápidos y profundos



☒ *Falco columbarius*

Esmerejón

Alas delgadas y afiladas. Cola larga. Rápidos aleteos consecutivos



☒ * *Falco sparverius*

Cernícalo americano

Claro por debajo. A menudo se le ve levitando con aleteos cortos y rápidos mirando al suelo.



☒ *Circus hudsonius*

Gavilán rastreo

Alas largas y estrechas, cola larga y delgada, planea en "V". Disco facial



☒ *Cathartes aura*

Guala cabecirroja

Alas muy anchas y largas, cola larga y redonda, comportamiento de vuelo en "V" a la distancia la cabeza es casi nula



☒ *Pandion haliaetus*

Águila pescadora

Silueta en forma de "M" alas anchas y alargadas, parches negros en las alas y cola larga

* Observado al norte del continente

☒ Con poblaciones residentes

Esta guía ha sido realizada con el apoyo financiero de la Asociación de migración de rapaces (HMA). HMA es una organización sin fines de lucro comprometida con la conservación de las aves rapaces a través del estudio científico, el disfrute y la apreciación de la migración de las aves rapaces.

